RHINOLIN®

MUCOLÍTICO

Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION INYECTABLE

ACCIÓN TERAPÉUTICA

MUCOLÍTICO

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:
Bromhexina Clorhidrato.....3 mg Excipientes c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES DE USO

Indicado en el tratamiento de las enfermedades respiratorias asociadas a una mayor producción o a un aumento en la viscosidad del mucus bronquial, tales como bronquitis aguda o crónica, broncopneumonía aguda o crónica, rinitis. Asimismo se indica como terapia de apoyo al tratamiento antimicrobiano específico.

DOSIS

Dosis del principio activo:
- Caballos: 0,15 mg / Kg.
- Bovinos, perros y gatos: 0,5 mg / Kg.

Dosis del producto:
- Caballos: 5 mL / 100 kilos. (Como referencia potrillos: 10 a 15 mL / día; caballos adultos: 20 a 30 mL / día).
- Bovinos: 5 mL / 30 kilos. (Como referencia terneros: 5 a 30 mL /día; bovinos adultos: 30 a 65 mL / día).
- Perros: 2,5 mL / 15 kilos.
- Gatos: 0,5 mL / 3 kilos.

Administrar cada 24 horas. Para lograr un óptimo efecto se recomienda la administración por al menos 5 días acorde al Médico Veterinario tratante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía intramuscular.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en casos de edema pulmonar. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Bromhexina.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños. Si la dosis requerida es mayor a 20 mL, se sugiere dividirla en dos o más puntos de aplicación. En caso de etiología de origen infeccioso, deberá acompañarse en su uso con un antibiótico específico.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En el caso de exposición ocular, irrigar los ojos con agua a temperatura ambiente por al menos 15 minutos. Si existe irritación o ésta persiste consultar a un médico.

En el caso de exposición dérmica, lavar el área con agua y jabón. Si existe irritación o ésta persiste consultar a un médico.

En el caso de inyección accidental se debe solicitar atención médica.

EFECTOS ADVERSOS

No se han descrito.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos carne: 0 días. No administrar a bovinos cuya leche se destine a consumo humano. No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.
Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1815

Panamá: Reg. N° RF-8354-18

Rep. Dominicana: Reg. No 6343

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario