

METRICINA®

ANTIBIÓTICO.



Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

DESCRIPCIÓN

Metricina®, Comprimido oral, está indicado para el tratamiento de afecciones buco dentales (gingivitis, estomatitis y periodontitis) en perros, causadas por bacterias susceptibles a la asociación, tales como Moraxella spp., Bacteroides spp., Porphyromonas (Bacteroides) asaccharolyticus, Peptostreptococcus spp., Espiroquetas patógenas orales y Treponema spp.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Metronidazol.....125 mg
Espiramicina.....750.000 U.I.
Excipientes c.s.p..... 1 comprimido

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Dosis de los principios activos: 12,5 mg de Metronidazol y 75.000 U.I. de Espiramicina por kilo de

peso, una vez al día, durante 7 a 10 días. Dosis del producto: Un comprimido por cada 10 kilos de peso, una vez al día, durante 7 a 10 días. Vía oral. Administrar junto con el alimento o directamente en la boca del animal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- El Metronidazol interactúa con Cimetidina. El metabolismo hepático del Metronidazol se ve disminuido cuando se administran ambos fármacos de manera conjunta.
- El Fenobarbital puede inducir enzimas microsomales hepáticas, aumentando el metabolismo del Metronidazol, resultando en menor vida media y concentraciones plasmáticas.
- El efecto de los macrólidos puede ser antagónico al ser utilizados en conjunto con Cloranfenicol o lincosamidas.
- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en animales con hipersensibilidad al Metronidazol, derivados nitroimidazólicos o Espiramicina.
- No administrar en animales severamente debilitados.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en animales reproductores.
- No usar en conjunto a Cloranfenicol o lincosamidas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Use guantes para administrar el producto.
- Lavarse las manos después de la administración del producto.
- No comer, beber o fumar en el momento de la manipulación y administración del producto.
- En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Acudir a un centro médico cercano.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. En el caso de existir algún tipo de irritación se recomienda acudir al médico.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile

REGISTROS

Reg. SAG N° 2476-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario