CABATINA®

ANTIHEMORRÁGICO

Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION ORAL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antihemorrágico

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:
Vitamina K1 (Fitomenadiona).....20 mg
Excipientes c.s.p.....1mL

PROPIEDADES

La vitamina K es un cofactor en la última etapa de la síntesis hepática de los factores de la coagulación II (Protrombina), VII (Proconvertina), IX (Componente Tromboplastínico del plasma) y X (Factor de Stuart).

El proceso de formación de factores de coagulación vitamina K dependientes, se puede ver interrumpido por diversas razones, como por ejemplo, enfermedades congénitas, deficiencia de vitamina K como resultado de bajos aportes dietéticos, síndromes de malabsorción, antibioticoterapias de amplio espectro extensas u otros. En Medicina Veterinaria, la causa más frecuente de cese de formación de factores de coagulación K dependientes, es la intoxicación por rodenticidas anticoagulantes.

La Vitamina K1 antagoniza los efectos de los agentes rodenticidas anticoagulantes y permite reactivar el proceso de producción de los factores de coagulación K dependientes.

INDICACIONES DE USO

Cabatina® es un producto indicado para el tratamiento de intoxicaciones generadas por rodenticidas anticoagulantes y de procesos hemorrágicos relacionados con la formación defectuosa de los factores de coagulación dependientes de Vitamina K.

MODO DE APLICACIÓN

Para mejorar su absorción, se recomienda administrar **Cabatina** junto con una cucharada de alimento enlatado para perros o gatos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

DOSIS

Dosis del principio activo:

- **Perros:** 2 mg/Kg de Vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas.
- **Gatos:** 5 mg/Kg de Vitamina K1, una vez al día, durante 3 semanas.

Dosis del producto:

- **Perros:** 1mL de **Cabatina®** por cada 10Kg de peso corporal, una vez al día, durante 3semanas.
- **Gatos:** 1 mL de **Cabatina®** por cada 4 Kg de peso corporal, una vez al día, durante 3 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Las siguientes medicaciones pueden prolongar o potenciar los efectos de los anticoagulantes y antagonizar algunas de las acciones terapéuticas de la Vitamina K1: Fenilbutazona, Aspirina, Cloranfenicol, Sulfonamidas (incluyendo Sulfa/Trimetoprim), Diazóxido, Alopurinol, Cimetidina, Metronidazol, esteroides anabólicos, Eritromicina, Ketoconazol, Propanolol y drogas tiroideas.

La administración conjunta de Vaselina puede disminuir la absorción de Vitamina K.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la Vitamina K.

- No administrar en animales con insuficiencia hepática severa.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Este producto no corrige la hipoprotrombinemia resultante del daño hepatocelular.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- En caso de contacto con la piel se recomienda lavar las manos con jabón y abundante agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.

- En el caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por 15 minutos. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.

- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

- Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C, protegido de la luz.
- Una vez abierto, utilizar dentro de 8 semanas. Descartar el producto sin utilizar después de ese periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 25 mL

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2096

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-No 009805/21

Perú: Reg. SENASA F.77.32.I.0053

Costa Rica: Reg. N° MV-7129

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario