HASYUN®

ANTIINFLAMATORIO ESTEROIDAL

Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION INYECTABLE

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio esteroidal

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Dexametasona Sodio Fosfato.....5,26 mg
(Equivalente a 4 mg de Dexametasona base)
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES DE USO

Indicado en el tratamiento de shock; en desórdenes inflamatorios y alérgicos en perros, gatos, bovinos, caballos y cerdos; cetosis primaria en bovinos; inducción de parto en bovinos, ovinos y cerdos e hipoadrenocorticismo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Endovenosa o intramuscular.

DOSIS

ESPECIE	DOSIS DEL PRINCIPIO ACTIVO SEGÚN TERAPIA	DOSIS DEL PRODUCTO SEGÚN TERAPIA
Perros	**Desórdenes inflamatorios:** 0,05-0,2 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. **Shock:** 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.	**Desórdenes inflamatorios:** 0,125-0,5 mL/10 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. **Shock:** 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Gatos	**Desórdenes inflamatorios:** 0,1-0,3 mg/Kg de peso vivo al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. **Shock:** 4-6 mg/Kg de peso, vía I.V lenta, en dosis única.	**Desórdenes inflamatorios:** 0,1-0,3 mL/4Kg de peso al día, vía I.V. o I.M, por 3-5 días. **Shock:** 1-1,5 mL/Kg de peso, vía I.V. lenta, en dosis única.
Bovinos	**Desórdenes inflamatorios, cetosis:** 0,0125- 0,05 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. **Inducción de parto:** 0,05-0,075 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	**Desórdenes inflamatorios, cetosis:** 1,25-5 mL/400 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. **Inducción de parto:** 5- 7,5 mL/400 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Cerdos	**Desórdenes inflamatorios:** 0,02-0,08 mg/Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. **Shock:** 0,5-5 mg/Kg, vía I.V.	**Desórdenes inflamatorios:** 0,5-2 mL/100 Kg de peso al día, vía I.V. o I.M. **Shock:** 0,125-1,25 mL/Kg, vía I.V.
Ovinos	**Inducción del parto:** 0,16-0,32 mg/Kg de peso, vía I.M, en dosis única.	**Inducción del parto:** 2- 4 mL/50 Kg de peso, vía I.M., en dosis única.
Caballos	**Desórdenes inflamatorios:** 0,005-0,01 mg/Kg de peso al día, vía I.V. **Shock:** 4-6 mg/Kg, vía I.V.	**Desórdenes inflamatorios:** 0,625-1,25 mL/500 Kg al día, vía I.V. **Shock:** 1 a 1,5 mL/Kg, vía I.V.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en infecciones virales.

- No usar en animales con tuberculosis, nefritis crónica, Síndrome de Cushing, úlcera péptica o diabetes (excepto cuando se use como terapia de emergencia).

- No usar en animales hipersensibles a la Dexametasona.

- No administrar en hembras preñadas.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- En caso de terapia prolongada (más de 7 días) se debe suspender gradualmente en días sucesivos.

- De requerirse un efecto corticoesteroide permanente, la terapia oral es la recomendada.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a Dexametasona.

- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.

- No manipular por mujeres embarazadas.

- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

EFECTOS ADVERSOS

Puede causar polifagia, poliuria y polidipsia, retrasar la cicatrización de heridas, debilitar la resistencia a infecciones o agravar las ya existentes. En tratamientos prolongados puede causar hiperadrenocorticismo iatrogénico (Síndrome de Cushing), con pérdida de masa muscular, debilidad, ganancia de peso con redistribución grasa, osteoporosis y úlceras.

PERÍODO DE RESGUARDO

Bovinos, Ovinos, Cerdos:

- Carne: 5 días.
- Leche: 3 días.

Caballos:

No administrar a caballos cuya carne se destine al consumo humano.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase utilizar dentro de 4 semanas.
Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N °: 1366

Uruguay: Reg. MGAP N° A-4495

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario