INVETROID®

ANTIPARASITARIO EXTERNO DE EFECTO RESIDUAL

Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCION EXTERNA

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ANTIPARASITARIO EXTERNO DE EFECTO RESIDUAL

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución concentrada contiene: Cipermetrina..... 20 g Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES DE USO

Invetroid® es un antiparasitario eficaz en el control de piojos (*Bovicola ovis, Bovicola bovis, Linognathus pedalis, Linognathus ovillus, Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Haematopinus suis)*, ácaros de la sarna (*Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Sarcoptes scabiei var. suis*) y melófagos (*Melophagus ovinus*) en bovinos, ovinos y cerdos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso externo.

DOSIS

Bovinos y ovinos:

- **Baños para la sarna y piojos:** Diluir 1 litro de **Invetroid®** en 1.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de baño de 0,02%). En la reposición y refuerzo utilizar una dilución de 1,5 litros del producto en 1.000 litros de agua (equivalente a una concentración de 0,03%); ello cuando el nivel del bañadero haya descendido alrededor de un 10%.

- **Para reposición y refuerzo en seco**: Diluir 500 mL de I**nvetroid®** en 1.000 litros de agua

(equivalente a una concentración final de 0,01%). Esta dilución se puede usar en aspersión aplicando a razón de 3-4 litros por animal.

Melófagos del Ovino (Melophagus ovinus: “falsa garrapata”):

- **Baño de inmersión:** Carga: 1 litro de **Invetroid®** en 10.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de baño de 0,002%). Reposición: 1 litro en 8.000 litros de agua (equivalente a una concentración de 0,0025%), cuando el nivel haya bajado un 20%. Se debe asegurar que los animales queden bien mojados, sumergiéndolos totalmente al menos dos veces. Cada 10.000 animales se debe renovar el baño. Una vez terminada la faena, se debe eliminar la totalidad del líquido restante.

- **Aspersión:** 1 litro de **Invetroid®** en 5.000 litros de agua (equivalente a una concentración final de 0,004%). Este sistema se recomienda como una forma de bajar la carga de melófagos en animales recién esquilados.

Cerdos

- **Sarna y piojos:** Aspersión: Diluir 1 mL de **Invetroid®** en 5 litros de agua (equivalente a una concentración final de 0,004%). Aplicar a razón de 3-4 litros por animal. Aplicar utilizando bomba de aspersión, distribuyendo el producto de manera uniforme sobre el animal.

Dosis única

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No bañar en horas de calor intenso, ni cuando los animales estén muy cansados y sedientos. - No usar durante estados avanzados de preñez ni durante la lactancia. - No administrar a animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Se debe asegurar que tanto los baños de inmersión como las bombas de aspersión estén completamente libres de residuos de otros productos que pudieran haberse aplicado con anterioridad. - Utilizar la mezcla en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto con los ojos del animal. - En caso de amenaza de lluvia, suspender el baño. En caso de lluvia dentro de las 24 horas posteriores al baño, repetir el tratamiento.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- El aplicador debe usar mascarilla y guantes como elemento de protección para la manipulación del producto. - Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas, la Cipermetrina es irritante y puede producir sensibilización cutánea. - Se debe evitar el contacto con los animales tratados hasta que estén completamente secos. - Lavar la ropa contaminada antes de su reutilización. - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. En el caso de contacto ocular, lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

EFECTOS ADVERSOS

En animales con hipersensibilidad a la Cipermetrina, podría observarse irritación dérmica.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días en bovinos y 7 días en ovinos y cerdos. Leche: 7 días.

OBSERVACIONES

VENENO (ícono calavera)

Mantener fuera del alcance de los niños. SOLUCIÓN EXTERNA USO EXTERNO USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

Almacenar a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.
Utilizar inmediatamente una vez preparada la solución y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 955

Rep. Dominicana: Reg. No 9685

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario