



GIRA



APLICA



PROTEGE

Seladrag®

GATOS - PERROS

Selamectina

Solución tópica • Spot-on

PROTECCIÓN INTERNA Y EXTERNA

CONTRA PARÁSITOS EXTERNOS
(PULGAS, GARRAPATAS, PIOJOS, ÁCAROS DEL OÍDO, ÁCAROS DE LA SARNA)
Y PARÁSITOS INTERNOS
(NEMATODOS)



SEGURO EN HEMBRAS
GESTANTES Y EN LACTANCIA



SEGURO DESDE LAS 6
SEMANAS DE EDAD



USO MENSUAL



DRAG PHARMA®
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA

6 DESAFÍOS CLÍNICOS EN LA PARASITOLOGÍA VETERINARIA ACTUAL

El manejo antiparasitario moderno en la clínica de pequeños animales enfrenta retos constantes que comprometen el bienestar animal y la salud pública.

INFESTACIONES MIXTAS

Frecuente coexistencia de endoparásitos (nematodos intestinales) y ectoparásitos (pulgas, garrapatas, ácaros de oído, sarna).

EFFECTO DEL AMBIENTE

El 95% de la población de pulgas reside en el entorno. Un producto que no actúa sobre el ciclo biológico ambiental obliga al veterinario a procesos iterativos frustrantes y costosos para el cliente.

RIESGO ZONÓTICO Y DE SALUD PÚBLICA

Parásitos como *Toxocara* spp. o *Ancylostoma* spp., junto con agentes asociados a las pulgas como *Dipylidium caninum* y *Bartonella henselae*, representan un riesgo zoonótico para las familias.

SEGURIDAD EN ETAPAS CRÍTICAS

La fragilidad de tratar cachorros, gatitos o hembras gestantes con productos de margen de seguridad estrecho genera ansiedad operativa y fragmenta sus opciones terapéuticas.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Los tratamientos que dependen de múltiples administraciones, o de la combinación de varios productos (orales y tópicos), aumentan drásticamente el riesgo de incumplimiento por parte del tutor, resultando en fallas terapéuticas y reinfestaciones cíclicas.

ESTRÉS DE LA ADMINISTRACIÓN

Dificultad para administrar fármacos orales, especialmente en gatos o perros con sensibilidad.




EL DESAFÍO NO ES SOLAMENTE TRATAR UNA PARASITOSIS, ES MANTENER UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA EFICAZ, PRÁCTICA Y SOSTENIDA

SELAMECTINA

Selamectina, es una avermectina semisintética con buenos perfiles de eficacia y seguridad en perros y gatos, logrando combinar actividad ectoparasitocida y antihelmíntica, a dosis muy seguras. Tiene actividad adulticida, ovicida y larvicida frente a pulgas. Por lo tanto, rompe eficazmente el ciclo de vida de la pulga eliminando a las formas adultas, previniendo la incubación de huevos y matando a las larvas.

MECANISMO DE ACCIÓN



● = Selamectina ● = Ion Cloruro (Cl⁻) ● = Glutamato = Canal de Cloruro activado por Glutamato

LA DOSIS JUSTA, SEGURIDAD MÁXIMA,
PROTECCIÓN EFECTIVA PARA
PERROS Y GATOS

Seladrag®

GATOS - PERROS

Selamectina

Antiparasitario interno y
externo para perros y gatos
Solución tópica • Spot-on

¿POR QUÉ PREFERIR SELADRAG®?



APTO PARA ETAPAS CRÍTICAS

Demostrada seguridad en **cachorros y gatitos** a partir de las 6 semanas de vida, así como en **hembras gestantes y en lactancia**.



PERFIL DE SEGURIDAD Y TOLERANCIA

En gatitos de 6 semanas se administraron dosis de hasta 10 veces la dosis mínima recomendada, durante 7 tratamientos mensuales consecutivos, manteniéndose un excelente perfil de seguridad (1).

En perros, también existen estudios con dosis repetidas hasta varias veces la dosis recomendada sin observar efectos clínicamente relevantes (2).



ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TISULAR

Vía Spot-on de absorción sistémica: Tras la aplicación tópica, la Selamectina se absorbe eficientemente a través de la piel hacia el torrente sanguíneo.



RESISTENCIA AL AGUA Y BAÑOS

Baja solubilidad en agua: Una vez absorbido (aproximadamente 2 horas post-aplicación), el principio activo permanece en el sebo corporal y la circulación sistémica.

Inalterabilidad de la eficacia: Estudios demuestran que los baños realizados 2 horas después de la aplicación no reducen su eficacia clínica contra pulgas ni parásitos internos.



CAT-FRIENDLY

Solución integral en una sola pipeta sin la resistencia asociada a las formulaciones orales.



USO MENSUAL

Se distribuye y concentra en las glándulas sebáceas de la piel, garantizando concentraciones terapéuticas prolongadas **durante al menos 30 días**.

(1) Krautmann MJ, Novotny MJ, De Keulenaer K, et al. Safety of selamectin in cats. Vet Parasitol 2000;91:393-403.
(2) Novotny MJ, Krautmann MJ, Ehrhart JC, et al. Safety of selamectin in dogs. Vet Parasitol 2000; 91: 377-391.



¿CÓMO SE APLICA?

Sistema
Twist & Use™

GIRA ▶ APLICA ▶ Y PROTEGE



Sostener la pipeta en posición vertical con la punta hacia arriba y girar la tapa hasta romper el sello; **la tapa no se separa**.



Separar el pelo de la mascota hasta dejar la piel visible; en gatos en la base del cráneo y en perros en la base del cuello (detrás de las escápulas).

Colocar la punta de la pipeta sobre la piel expuesta y apretar la pipeta hasta vaciar el contenido en un solo punto.



ESPECTRO DE ACCIÓN



			PERROS	GATOS
Pulgas Adultos, huevos y larvas	<i>Ctenocephalides</i> spp.		✓	✓
Garrapatas	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>		✓	
Piojos	<i>Trichodectes canis</i>		✓	
Ácaros	<i>Otodectes cynotis</i>		✓	✓
	<i>Sarcoptes scabiei</i>		✓	
Nematodos	<i>Toxocara canis</i>		✓	
	<i>Toxascaris leonina</i>		✓	
	<i>Toxocara cati</i>			✓
	<i>Ancylostoma tubaeforme</i>			✓
Dirofilarias *No presente en Chile	<i>Dirofilaria immitis</i>		✓	✓



¡IMPORTANTE!
¡NO RETIRAR LA TAPA!



Girar la tapa con la punta hacia arriba para evitar que el contenido se derrame al romper el sello.



La tapa no se separa de la pipeta. Solo girar hasta romper el sello.

Seladrag®

GATOS

Selamectina 45 mg

Con efecto adulticida, larvícida y ovicida frente a pulgas. Tratamiento efectivo contra pulgas, ácaros del oído, nematodos y control del gusano del corazón (no presente en Chile).

Composición:

Cada pipeta de solución tópica contiene:
Selamectina 45 mg
Excipientes c.s.p. 0,75 mL

Indicaciones de uso:

Seladrag® Gatos, está indicado para gatos con infestaciones o riesgo de infestaciones mixtas por parásitos internos y externos. Su uso es eficaz para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*). También está indicado para el tratamiento de infestaciones intestinales por estados adultos de nematodos (*Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*), así como para el control de la infección por microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (gusano del corazón) (no presente en Chile).

Especie de destino: Gatos.

Vía de administración: Tópica (Spot-on).

Dosis del principio activo: La dosis es de 6,0 a 17,3 mg de Selamectina por Kg de peso corporal.

Dosis del producto: Administrar **Seladrag® Gatos**, de acuerdo con la siguiente tabla de dosificación:

Gatos (Kg)	Dosis	mg de Selamectina aplicados	Concentración de Selamectina (mg/mL)	Volumen de pipeta (mL)
2,6 - 7,5 Kg	1 pipeta de Seladrag® Gatos	45	60	0,75
> 7,5 Kg	Combinación de 2 pipetas	90	60	0,75 x 2

Modo de empleo:

- Antes de usar, saque la pipeta de su envase. Para abrir, sostenga la pipeta en posición vertical con la punta hacia arriba y gire la tapa para romper el sello. La tapa permanecerá en la pipeta y no es posible removerla. La pipeta está abierta y lista para ser aplicada cuando se sienta el quiebre del sello.
- El animal debe estar de pie o recostado con su espalda en posición horizontal durante la aplicación.
- Separe el pelo de la nuca en la base del cráneo hasta que la piel quede visible.
- Coloque la punta de la pipeta sobre la piel expuesta y apriete la pipeta varias veces hasta vaciar su contenido completamente directo sobre la piel en un solo punto en la base del cráneo.
- Evite el contacto del producto con sus dedos.

Efectos adversos y reacciones adversas:

- Más del 10% de los animales tratados con Selamectina, podrían presentar leve enmarañamiento y presencia de polvo blanco en el pelaje luego del tratamiento, signos temporales, que resuelven espontáneamente dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.
- El uso de Selamectina en gatos se ha asociado, en aproximadamente 1% de los casos, con alopecia localizada leve transitoria en el lugar de la aplicación. En muy raras ocasiones se ha observado también irritación local transitoria. La alopecia e irritación suelen resolver espontáneamente, pero, en determinadas circunstancias, puede ser adecuado un tratamiento sintomático.
- En menos del 1% de los gatos, la posible ingestión oral de formulaciones de uso tópico de Selamectina debido al autoaseo, puede generar salivación leve transitoria y vómitos intermitentes hasta 56 horas después de la administración, signos que se recuperan por completo sin requerir terapia de apoyo y que no representan un riesgo significativo para los gatos.
- Otros efectos informados (incidencia menor o igual al 0,5%) incluyen diarrea, temblores musculares, anorexia, prurito/urticaria, eritema, letargo y taquipnea. Los efectos adversos son más probables después de la exposición oral a Selamectina. En el caso de observar estos efectos adversos contacte inmediatamente a su Médico Veterinario.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- El baño de los animales tratados, con o sin shampoo, desde las 2 h post tratamiento, no afecta la eficacia del producto.
- Administrar con precaución en animales enfermos, con enfermedades hepáticas, con bajo peso o debilitados.
- Las pulgas deben adherirse al huésped y comenzar a alimentarse para poder estar expuestas al principio activo; por lo tanto, no puede excluirse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por pulgas.
- Para el tratamiento de las infecciones por nematodos gastrointestinales, el Médico Veterinario que prescribe el tratamiento debe evaluar la necesidad y la frecuencia del mismo, así como la elección del tratamiento (medicamento veterinario simple o combinado).
- La resistencia de los parásitos a cualquier clase específica de antihelmíntico puede desarrollarse después del uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de esa clase. Por consiguiente, el uso de **Seladrag® Gatos** debe basarse en la evaluación de cada caso por separado y en la información epidemiológica local sobre la susceptibilidad actual de la especie en cuestión, a fin de limitar la posibilidad de una futura selección de resistencia.
- Se recomienda realizar periódicamente un control ambiental de ectoparásitos en las áreas donde vive la mascota y tratar adecuadamente a todos los animales con los cuales cohabita.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Selamectina puede ser utilizada en hembras preñadas, en lactancia y en animales reproductores.

Contraindicaciones:

- No administrar en animales menores a 6 semanas de edad o en animales con un peso inferior a 2,6 Kg.
- No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Selamectina u otras avermectinas.
- No aplicar sobre piel lesionada o sobre pelaje mojado.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Condición de venta: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PERROS 0.5

Selamectina 60 mg

PERROS 1.0

Selamectina 120 mg

PERROS 2.0

Selamectina 240 mg

Con efecto adulticida, larvícida y ovicida frente a pulgas. Tratamiento efectivo contra pulgas, piojos, garrapatas, ácaros, nematodos y control del gusano del corazón (no presente en Chile).

Composición:

Cada pipeta de solución tópica contiene:

Seladrag® Perros 0.5

Selamectina 60 mg
Excipientes c.s.p. 0,5 mL

Seladrag® Perros 1.0

Selamectina 120 mg
Excipientes c.s.p. 1,0 mL

Seladrag® Perros 2.0

Selamectina 240 mg
Excipientes c.s.p. 2,0 mL

Indicaciones de uso:

Seladrag® Perros, está indicado para perros con infestaciones o riesgo de infestaciones mixtas por parásitos internos y externos. Su uso es eficaz para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*), el tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*), ácaros del oído (*Otodectes cynotis*), piojos (*Trichodectes canis*) y ácaros causantes de sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*). También está indicado para el tratamiento de infestaciones intestinales por estados adultos de nematodos (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*); así como para el control de la infección por microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (gusano del corazón) (no presente en Chile).

Especie de destino: Perros.

Vía de administración: Tópica (Spot-on).

Dosis del principio activo: La dosis es de 6 a 12 mg de Selamectina por Kg de peso corporal.

Dosis del producto: Administrar **Seladrag® Perros**, de acuerdo con la siguiente tabla de dosificación:

Perros (Kg)	Dosis	mg de Selamectina aplicados	Concentración de Selamectina (mg/mL)	Volumen de pipeta (mL)
5,1 - 10,0 Kg	1 pipeta de Seladrag® Perros 0.5	60	120	0,5
10,1 - 20,0 Kg	1 pipeta de Seladrag® Perros 1.0	120	120	1
20,1 - 40,0 Kg	1 pipeta de Seladrag® Perros 2.0	240	120	2
> 40,0 Kg	Combinación apropiada de pipetas		120	

Modo de empleo:

- Antes de usar, saque la pipeta de su envase. Para abrir, sostenga la pipeta en posición vertical con la punta hacia arriba y gire la tapa para romper el sello. La tapa permanecerá en la pipeta y no es posible removerla. La pipeta está abierta y lista para ser aplicada cuando se sienta el quiebre del sello.
- Separe el pelo en la base del cuello, delante de las escápulas, hasta que la piel sea visible.
- Coloque la punta de la pipeta sobre la piel expuesta y apriete la pipeta varias veces hasta vaciar su contenido completamente directo sobre la piel en un solo punto.
- Evite el contacto del producto con sus dedos.

Efectos adversos y reacciones adversas:

- Más del 10% de los animales tratados con Selamectina, podrían presentar leve enmarañamiento y presencia de polvo blanco en el pelaje luego del tratamiento, signos temporales, que resuelven espontáneamente dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.
- En ensayos de campo, los efectos adversos fueron raros. Otros efectos informados (incidencia menor o igual al 0,5%) incluyen diarrea, vómitos, temblores musculares, anorexia, prurito/urticaria, eritema, letargo, salivación y taquipnea. En raras ocasiones, se han informado convulsiones y ataxia en perros. Los efectos adversos son más probables después de la exposición oral a Selamectina. En el caso de observar efectos adversos contacte inmediatamente a su Médico Veterinario.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- El baño de los animales tratados, con o sin shampoo, desde las 2 h post tratamiento, no afecta la eficacia del producto.
- Administrar con precaución en animales enfermos, con enfermedades hepáticas, con bajo peso o debilitados.
- Usar con precaución en razas de perros de las razas Pastor Australiano, Collie o Sheltie, entre otros, por posible mutación del gen ABCB1-1Δ.
- Las garrapatas y pulgas deben adherirse al huésped y comenzar a alimentarse para poder estar expuestas al principio activo; por lo tanto, no puede excluirse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por garrapatas o pulgas.
- Para el tratamiento de las infecciones por nematodos gastrointestinales, el Médico Veterinario que prescribe el tratamiento debe evaluar la necesidad y la frecuencia del mismo, así como la elección del tratamiento (medicamento veterinario simple o combinado).
- La resistencia de los parásitos a cualquier clase específica de antihelmíntico puede desarrollarse después del uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de esa clase. Por consiguiente, el uso de **Seladrag® Perros** debe basarse en la evaluación de cada caso por separado y en la información epidemiológica local sobre la susceptibilidad actual de la especie en cuestión, a fin de limitar la posibilidad de una futura selección de resistencia.
- Se recomienda realizar periódicamente un control ambiental de ectoparásitos en las áreas donde vive la mascota y tratar adecuadamente a todos los animales con los cuales cohabita.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Selamectina puede ser utilizada en hembras preñadas, en lactancia y en animales reproductores.

Contraindicaciones:

- No administrar en animales menores a 6 semanas de edad o en animales con pesos inferiores al indicado en el envase.
- No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Selamectina u otras avermectinas.
- No aplicar sobre piel lesionada o sobre pelaje mojado.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Condición de venta: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO • USO EXTERNO

Elaborado y distribuido por:
Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300, Quilicura, Santiago, Chile.



www.dragpharma.cl



dragpharma



Laboratorio Drag Pharma

DRAG PHARMA®
CONFIABILIDAD TERAPÉUTICA